

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID: Net: 445/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Kabila Mujinga Megan
Age : 6 an(s)
Sexe : Female
Consultant : Dr. Kapinga Kayembe Didier

Sample No. : CN26/0067539
Date : 02-Feb-2026
Temps : 09:41 AM
Nombre d' examens : 26

Electrophorèse

Examen	Résultat	Unité	Valeurs de Référence
Électrophorèse de l'hémoglobine - Variante de l'hémoglobine			
Hémoglobine A1	97.3	%	94.3 - 98.5
Hémoglobine A2	2.5	%	1.5 - 3.7
Hémoglobine F	0.2	%	0.0 - 2.0
Hémoglobine S	0.0	%	0.0 - 0.0
Hémoglobine D	0.0	%	0.0 - 0.0
Hémoglobine C	0.0	%	0.0 - 0.0
Hémoglobine E	0.0	%	0.0 - 0.0
Autres sommets	0.0	%	0.0 - 0.0

Commentaire Pas de pic d'hémoglobine anormale observée. (Homozygote AA)

Électrophorèse des protéines (sérum)

Protéines totales	3.87	g/dl	6.00 - 8.00
Albumine	66.5	%	57.5 - 67.7
Alpha-1 Globulines	24.5	%	3.3 - 5.4
Alpha-2 Globulines	2.2	%	10.0 - 14.8
Bêta- Globulines	3.1	%	5.2 - 7.0
Gamma Globulines	3.7	%	7.7 - 14.8
BANDE DE MYELOME	Non-Détecté		

Commentaire Aucun pic d'immunoglobuline monoclonale n'est observé. La fraction alpha 1 est augmentée et on constate une diminution de la concentration des fractions protéiques alpha 2, bêta et gamma. La protéine totale est également réduite.
Une fraction élevée d'alpha-1 globuline dans l'électrophorèse des protéines d'un enfant indique généralement une réponse active en phase aiguë, telle qu'une infection, une inflammation chronique ou une tumeur maligne

